

بسمه تعالی

وزارت راه و شهر سازی

سازمان هواشناسی کشور


مدیریت شبکه پایش هواشناسی

خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی (هفته پنجاهم سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲)




تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور:

میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هفدهم شهریور ماه سال جاری ۱۸۶/۴ میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۱۷۶/۹ میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری ۵/۴ درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲۳۴/۵ میلیمتر بوده است که بارش سال جاری ۲۰/۵ درصد کمتر از بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته پنجاهم متعلق به منطقه ی املش استان گیلان به میزان ۳۹/۳ میلیمتر بوده است. گرم ترین منطقه دهلران استان ایلام به میزان ۴۷/۳ درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه الشتر استان لرستان به میزان ۱۰ درجه سلسیوس بوده است.

نقشه میانگین بارش بلند مدت کشور از ابتدای سال آبی تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۷



نقشه مجموع بارش کشور از ابتدای سال آبی تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۷



پیش بینی وضع هوا (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۲۵)

روز شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۸: رگبار باران با رعد و برق و وزش باد موقتی در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان روز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹: رگبار باران با رعد و برق و وزش باد موقتی و خیزش گرد و خاک در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان صبح یکشنبه: کاهش ۳ درجه دما در شمال غرب کشور روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰: رگبار باران با رعد و برق و وزش باد موقتی در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در شرق سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، شرق کرمان صبح دوشنبه: کاهش ۳ تا ۵ درجه دما در نوار شمالی روز سه شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۱: رگبار باران با رعد و برق و وزش باد موقتی در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، شرق کرمان صبح سه شنبه: کاهش ۳ تا ۵ درجه دما در شمال شرق و شرق کشور روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲: رگبار باران با رعد و برق و وزش باد موقتی در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، شرق کرمان صبح چهارشنبه: افزایش ۳ تا ۵ درجه دما در نیمه شمالی کشور روز پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۳: رگبار باران با رعد و برق و وزش باد موقتی در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، شرق کرمان صبح پنجشنبه: کاهش ۳ تا ۵ درجه دما در نیمه شمالی کشور روز جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۲۴: رگبار باران با رعد و برق و وزش باد موقتی در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، شرق کرمان صبح جمعه: کاهش ۳ تا ۵ درجه دما در نیمه جنوبی کشور روز شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۵: رگبار باران با رعد و برق و وزش باد موقتی در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات زنجان.

جدول وضعیت رشد محصولات در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی طی هفته گذشته

نام ایستگاه	نام محصول	وارثه	مرحله فنولوژی	آفات و بیماریه	میانگین دمای خاک (درجه سلسیوس)						مجموع واحد حرارتی (درجه روز)						رطوبت خاک %								
					۱۰۰	۵۰	۳۰	۲۰	۱۰	۵	۱۵	۱۰	۵	۰	۱۰۰	۵۰	۳۰	۲۰	۱۰	۵	۱۰۰	۵۰	۳۰	۲۰	۱۰
زرقان	فاقد محصول	-	-	-	عدم ارسال																				
آمل	فاقد محصول	-	-	-	عدم ارسال																				
اردبیل	فاقد محصول	-	-	-	عدم ارسال																				
اهواز	نخل	برخی	رطب	-	۳۹.۷	۳۸.۶	۳۷.۷	۳۷.۴	۳۷.۶	۳۶	۲۵.۲.۸	۲۱.۷.۸	۱۸.۲.۸	۱۴.۷.۸	۱۲.۱	۱۵.۹	۱۷.۵	۲۰.۶	۲۲	۲۲.۴	-	-	-	-	-
بسطام	انگور	سرخ فخری	رسیدن	-	۲۷.۴	۲۷.۴	-	۲۶.۵	۲۶.۸	۲۶	۱۷.۸.۵	۱۴.۳.۵	۱۰.۸.۵	۷.۳.۵	۱۲.۱	۱۳.۷	۱۳.۸	۱۴.۳	-	-	-	-	-	-	-
بزازجان	خرما	کبکاب	رطب	-	۴۸.۲	۴۶.۴	۴۱.۸	۴۲.۴	۴۲.۶	۴۸.۸	۳۶.۰	۲۲.۵	۱۹.۰	۱۵.۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داراب	پرتقال	واشنگتن	رشد میوه و برگ دادن	-	۳۷.۹	۳۶.۷	۳۶.۵	۳۵.۹	۳۵.۶	۳۵.۱	۲۳.۱	۱۹.۶	۱۶.۱	۱۲.۶	۱۵	۱۶	۱۷	۱۷	۱۱	۱۸	-	-	-	-	-
داراب	ذرت	Agn6۰۴	ظهور گل آذین تر	-	۳۷.۹	۳۶.۷	۳۶.۵	۳۵.۹	۳۵.۶	۳۵.۱	۲۳.۱	۱۹.۶	۱۶.۱	۱۲.۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دهلران	فاقد محصول	-	-	-	عدم ارسال																				
فرخشهر	زعفران	تربت حیدریه	رکود تابستانه	-	۳۱.۵	۲۹	۲۶.۷	۲۵.۸	۲۴.۷	۲۲.۸	۱۶.۴.۷	۱۲.۹.۷	۹.۴.۷	۵.۹.۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرخشهر	لوبیا	کوشا	پر شدن غلاف	-	۳۱.۵	۲۹	۲۶.۷	۲۵.۸	۲۴.۷	۲۲.۸	۱۶.۴.۷	۱۲.۹.۷	۹.۴.۷	۵.۹.۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گلمکان	انگور	کشمشی	جوانه زنی	علف هرز	۲۹.۹	۲۸.۶	۲۷.۹	۲۷.۷	۲۷.۸	۲۷.۶	۱۵.۴	۱۱.۹	۸.۴	۴.۹	۸.۶	۱۰.۸	۱۲.۱	۱۱.۷	۸.۷	۹.۵	-	-	-	-	-
گنبد کاووس	-	-	-	-	عدم ارسال																				
اکباتان	فاقد محصول	-	-	-	عدم ارسال																				
قراخیل	پرتقال	تامسون	رشد میوه	-	۲۹.۱	۲۸	۲۷.۶	۲۷.۱	۲۶.۵	۲۵.۴	۱۹.۳	۱۵.۸	۱۲.۳	۸.۸	۱۴	۱۲	۱۲	۱۷	۲۰	۲۰	-	-	-	-	-
حاجی آباد	پرتقال	محلی	رشد میوه و برگ	-	۳۹.۲	۳۸	۳۶	۳۵.۷	۳۴.۶	۳۳	۲۲.۹.۷	۱۹.۴.۷	۱۵.۹.۷	۱۲.۴.۷	۱۹.۸	۲۰.۳	۲۰.۳	۱۹.۶	۱۹	-	-	-	-	-	-
هاشم آباد	فاقد محصول	-	-	-	عدم ارسال																				
چهرم	پرتقال	واشنگتن ناز	رشد میوه	-	۳۷.۳	۳۵.۸	۳۴.۸	۳۴.۶	۳۴.۷	۳۴.۱	۲۱.۷.۶	۱۸.۲.۶	۱۴.۷.۶	۱۱.۲.۶	۲۴	۲۳	۲۳	۳۰	۳۳	۲۳.۱	-	-	-	-	-
چهرم	خرما	شاهانی	رطب	-	۳۷.۳	۳۵.۸	۳۴.۸	۳۴.۶	۳۴.۷	۳۴.۱	۲۱.۷.۶	۱۸.۲.۶	۱۴.۷.۶	۱۱.۲.۶	۲۴	۲۳	۲۳	۳۰	۳۳	۲۳.۱	-	-	-	-	-
کیبوتر آباد	فاقد محصول	-	-	-	عدم ارسال																				
کرج	ذرت	BK66	تشکیل نار ابریشمی	-	۳۳.۷	۳۲.۶	۳۲.۷	۳۰.۶	۳۰.۴	۲۷.۱	۱۹.۵	۱۶.۰	۱۲.۵	۹.۰	۳۰	۳۰	۲۸	۲۵	۱۰	-	-	-	-	-	-
خسرو شاه	فاقد محصول	-	-	-	عدم ارسال																				
میاندوآب	آلو	شابلون	رشد شاخ و برگ	-	۳۱.۵	۳۰	۲۹.۵	۲۸.۶	۲۷.۳	۲۷.۳	۱۷.۰	۱۳.۵	۱۰.۰	۶.۵	۱۱.۱	۱۴.۵	۱۷.۳	۲۸	۳۳.۸	-	-	-	-	-	-
میاندوآب	چغندر قند	اکباتان	ضخیم شدن غده	-	۳۱.۵	۳۰	۲۹.۵	۲۸.۶	۲۷.۳	۲۷.۳	۱۷.۰	۱۳.۵	۱۰.۰	۶.۵	۱۱.۱	۱۴.۵	۱۷.۳	۲۸	۳۳.۳	-	-	-	-	-	-
دانشگاه زنجان	فاقد محصول	-	-	-	عدم ارسال																				
میناب	کنار	دوکی	رشد سرشاخه	-	۴۱.۲	۴۰.۶	۳۹.۶	۳۹.۵	۴۰.۳	۳۹.۳	۲۴.۴	۱۹.۹	۱۶.۴	۱۲.۹	۸	۸	۱۰	۱۱	۱	۱۳	-	-	-	-	-
میاندوآب	پرتقال	والنسیا	تشکیل میوه	-	۳۹.۴	۳۹.۲	۳۸.۲	۳۸.۱	۳۸.۱	۳۸.۱	۲۴.۱.۵	۲۰.۶.۵	۱۷.۱.۵	۱۳.۶.۵	۱۱	۱۱	۱۰	۱۰	۹	۸	-	-	-	-	-
میاندوآب	چغندر قند	مضافتی	خرما	-	۳۹.۴	۳۹.۲	۳۸.۲	۳۸.۱	۳۸.۱	۳۸.۱	۲۴.۱.۵	۲۰.۶.۵	۱۷.۱.۵	۱۳.۶.۵	۱۱	۱۱	۱۰	۱۰	۹	-	-	-	-	-	
نازلو ارومیه	سیب	گلدن	رسیدن	-	۳۱.۹	۳۱.۶	۳۲.۶	۳۲.۸	۳۳	۳۰.۸	۱۸.۸	۱۵.۳	۱۱.۸	۸.۳	۲۶.۸	۲۷.۴	۲۸.۲	۲۹.۲	۳۰.۱	-	-	-	-	-	-
نجف آباد	بادام	شاهرود ۱۲	رشد ساقه	-	۳۶.۶	۳۵.۴	۳۴.۳	۳۳.۵	۳۳	۳۱.۵	۲۰.۵.۶	۱۷.۰.۶	۱۳.۵.۶	۱۰.۰.۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۰	۱۷	-	-	-	-	-	
نجف آباد	انگور	عسکری	رسیدن شاخه های مو	-	۳۶.۶	۳۵.۴	۳۴.۳	۳۳.۵	۳۳	۳۱.۵	۲۰.۵.۶	۱۷.۰.۶	۱۳.۵.۶	۱۰.۰.۶	۲۵	۲۴	۲۰	۱۹	۱۷	-	-	-	-	-	
نجف آباد	انار	ملس دانه قرمز	رشد میوه	-	۳۶.۶	۳۵.۴	۳۴.۳	۳۳.۵	۳۳	۳۱.۵	۲۰.۵.۶	۱۷.۰.۶	۱۳.۵.۶	۱۰.۰.۶	۲۵	۲۴	۲۰	۱۹	۱۶	-	-	-	-	-	
نیشابور	ذرت	سینگل کراس ۷۰۴	شیری شدن	-	۳۴.۶	۳۵.۶	۳۲.۴	۳۰.۶	۲۸.۲	۱۸.۸.۴	۱۴.۵.۴	۱۰.۶.۲	۷.۵.۴	۲۱.۶	۲۲.۴	۲۳	۲۳.۶	۲۰.۶	۱۸.۶	-	-	-	-	-	
اولتان مغان	سویا	L-17	دانه بستن	-	۳۱.۵	۲۹.۵	۲۹.۳	۲۹.۲	۲۹.۴	۲۷.۹	۱۸.۸	۱۵.۳	۱۱.۸	۸.۳	۱۵.۵	۱۶.۲	۱۶.۵	۱۵	۱۳.۸	-	-	-	-	-	-
رفسنجان	-	-	-	-	عدم ارسال																				
رشت	فاقد محصول	-	-	-	عدم ارسال																				
سامان	بادام	شاهرود ۱۰	رسیدن میوه	بوسیدیگی تنه	۳۳.۴	۳۰.۳	۲۷.۹	۲۶.۹	۲۶.۲	۲۴.۲	۱۷.۴	۱۳.۹	۱۰.۴	۶.۹	۵.۲	۵.۷	۷.۹	۱۱.۳	۱۴	۱۶.۲	-	-	-	-	-
صفی آباد	ذرت	S.c704	ده برگی	-	۴۲.۸	۴۰.۸	۳۹.۱	۳۸.۶	۳۸	۳۶.۲	۲۵.۳	۲۱.۸	۱۸.۳	۱۴.۸	۱۵.۳	۱۸	۱۷.۹	۱۷.۱	۱۶.۴	۱۳.۹	-	-	-	-	-
سرآرود	فاقد محصول	-	-	-	عدم ارسال																				
سیلاخور	فاقد محصول	-	-	-	عدم ارسال																				
زهک	فاقد محصول	-	-	-	عدم ارسال																				

توصیه های هواشناسی کشاورزی (از تاریخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۲ لغایت ۱۵/۰۶/۱۴۰۲)

استان آذربایجان شرقی:

- افزایش دور آبیاری (زیاد کردن فاصله آبیاری ها) و محلولپاشی با سولوپتاس در مورد درختان گردو سرشاخه کاری شده
- محلول پاشی با سیلیکات پتاسیم و استفاده از کودهای پتاسه برای جلوگیری از تنش آبی
- نظارت بر کنترل مکانیکی لاروهای کرم خراط و ردیابی آفات قرنطینه ای
- ضدعفونی بذور غلات و تراکم گیری و کنترل جوندگان مضر
- تهیه و آماده کردن زمین جهت کشت غلات پاییزه در مناطق سردسیر استان
- تسریع در کشت دانه روغنی کلزا در مناطق سردسیر استان

استان آذربایجان غربی:

- انجام آبیاری پایانی باغات سیب در اسرع وقت در صورت نیاز آبی
- برداشت به موقع انواع لوبیای کشت شده و خرمن کوبی محصولات تولیدی.
- انجام کلسیم پاشی در باغات سیب
- خودداری از هرگونه سمپاشی و محلول پاشی باغات در ساعات گرم روز
- محلول پاشی پتاسیم در باغاتی که قبلا کلسیم پاشی انجام گرفته است (باغات سیب)

استان اردبیل:

- پایش آفات و بیماری های درختان میوه و سمپاشی (و یا مبارزه) با مشاوره کارشناسان جهاد کشاورزی؛
- انجام تغذیه باغات با مشاوره کارشناسان جهاد کشاورزی و همچنین انجام بهداشت باغات؛
- به علت وجود بیماری سفیدک دروغی سیب زمینی، برداشت مزارع در آب و هوای خشک صورت پذیرد؛ و از انتقال غده های آلوده به انبار جلوگیری شود. همچنین بقایای گیاهی معدوم شود.

استان اصفهان:

- مصرف کودهای پتاسه جهت تسریع در رسیدگی بموقع محصول با توجه به احتمال وقوع بارشهای زودهنگام پاییزی در محصولات ذرت، سورگوم و کینوا
- آماده سازی مزارع کلزا در غرب و جنوب استان جهت کشت به موقع
- آماده سازی مزارع دیم کشت پاییزه جهت انجام کشت به موقع با توجه به احتمال وقوع بارشهای پاییزه زودهنگام
- خاک دهی مزارع زعفران با مخلوط خاک و کودهای حیوانی پوسیده با توجه به احتمال بارشهای زودهنگام پاییزه
- اقدامات لازم در گلخانه ها جهت مقاوم سازی در برابر وزش بادهای شدید
- کشت کلزا در مزارع سردسیر استان و آبیاری خاک آب و پی آب جهت دست یابی به مرحله روزت و عدم برخورد با پدیده سرمازدگی پاییزه

استان البرز:

- استفاده از هورمون « پیکس » در مزارع پنبه
- استفاده از کود « اوره » در مزارع ذرت
- شرایط محیا جهت آماده سازی زمین برای کشت پاییزه « کلزا »
- با توجه به شرایط دمایی، انجام مراقبت های لازم جهت مبارزه با « شته روغنی » در مزارع یونجه
- با توجه به شرایط اقلیمی، مراقبت های لازم در خصوص مبارزه با آفات مکنده، جهت جلوگیری از توسعه بیماریهای ویروسی در مزارع سبزی و صیفی
- گلخانه داران گوجه فرنگی و فلفل، انجام پایش و مراقبت های لازم در خصوص ویروس « روگوز » یا چروکیدگی قهوه ایی

استان ایلام :

- وجین علف های هرز مزارع ذرت و چغندر قند در ساعات خنک شبانه روز و همچنین ماخار کردن و آماده سازی مزارع جهت کشت کلزا و محصولات پاییزه
- تدابیر لازم جهت بررسی تجهیزات سیستم خنک کننده گلخانه ها و همچنین استحکام دریچه ها مدنظر باشد
- محلول پاشی کودهای ریزمغذی-هیومیک اسید و فولیک اسید در مزارع ذرت بعد از مرحله ۸ برگی و در ساعات خنک شبانه روز
- حفظ ارتفاع آب در مزارع برنج جهت جلوگیری از تنش کم آبی
- مبارزه با کرم برگخوار ذرت با رها سازی زنبور براکون یا سم پاشی در ساعات خنک شبانه روز

استان بوشهر:

- با توجه به احتمال بروز ناپایداری های همرفتی، اقدام به تهیه مطبوع گلخانه ها و استفاده از انواع قارچکش ها تا اواخر هفته جاری.
- ردیابی سفیدک برگی در محصولات جالیزی و مصرف قارچ کش های محافظتی در محصولات گلخانه ای.
- در صورت روئیت و ازدیاد شب پره مینوز، مصرف انواع آفت کش ها و سم پاشی محصولات گلخانه ای.
- با توجه به پایداری هوا و مرحله رشد میوه درختان مرکبات، اقدام به تغذیه درختان مرکبات (ساعات اولیه صبح) طی روزهای آتی.
- بلحاظ رخداد ناپایداری های همرفتی، طی دوشنبه (فردا) عدم مجاز به هرگونه سمپاشی و محلول پاشی باغات مرکبات و نخیلات.
- از سه شنبه هفته جاری، با عنایت به پایداری هوا، افزایش دما و همچنین کاهش رطوبت هوا، اقدام به آبیاری باغات مرکبات و نخیلات طی ساعات اولیه صبح.

استان تهران :

- احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد متوسط.
- تنظیم دما و تهیه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل هوای گرم.
- تنظیم دور آبیاری و افزایش رطوبت سطح باغ به دلیل دما بالا.
- کشاورزان از روشن کردن آتش در مزارع و آتش زدن کاه و کلش با وجود گرمای روزانه هوا اجتناب کنند

استان چهارمحال بختیاری :

- پایش و مبارزه با آفت مهم سرشاخه خوار هلو با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی در ساعات بدون وزش باد (اوایل صبح).
- مبارزه با نسل دوم کرم سیب در ساعات بدون وزش باد (اوایل صبح).
- مبارزه با بیماری سفیدک هلو با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی در ساعات بدون وزش باد (اوایل صبح).
- مدیریت زمان انجام آبیاری مزارع ذرت جهت جلوگیری از ورس و احتمال خوابیدگی بوته ها با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید لحظه ای طی چند روز آینده.
- مبارزه با آفت بید چغندر قند (لیتا) با توجه به گرمای هوا.
- پایش و مبارزه با بیماری سوختگی برگ های لوبیا (به ویژه در مزارع مجهز به سیستم آبیاری بارانی) با توجه به خنک شدن هوا (به ویژه در صبحگاه) طی روزهای آینده.

استان خراسان شمالی :

- تامین بذر و کود و آماده سازی بستر کشت پاییزه
- انتقال محصولات برداشت شده به انبارهای مسقف و استاندارد
- آماده سازی بارگاه های بهداشتی کشمش و محافظت از آنها در برابر بارش های فصلی
- در صورت نیاز ترمیم اماکن نگهداری دام و طیور به منظور جلوگیری از بارش های آتی

- تامین خوراک مورد نیاز دام و کندوهای زنبور عسل برای فصل سرما

استان خراسان رضوی :

- تنظیم دما، رطوبت و تهویه گلخانه‌ها، سالن‌های مرغداری و دامداری‌ها
- احتیاط در انجام سم پاشی و محلول پاشی و اقدام در ساعات آرام و خنک روز
- اقدام جهت تهیه پیاز مناسب و آماده سازی زمین برای کشت زعفران، برای کشاورزانی که امکان کاشت در خرداد ماه را نداشتند
- اقدام نسبت به آماده سازی بستر بذر و کشت، با توجه به تاریخ کشت ارقام زمستانه گندم در مناطق سردسیر
- به دلیل اهمیت تاریخ کشت کلزا در موفقیت تولید کشت آبیاری در مناطق سردسیر و معتدل سرد از ابتدای شهریور تا ۱۰ مهر اقدام گردد. تاخیر در کشت موجب خسارت سرمازدگی خواهد شد.
- پایش و مبارزه با پسیل در باغات پسته

استان خوزستان :

- آبیاری منظم نخیلات
- برداشت رطب و سورت کردن آن و ارسال به بازار یا نگهداری در شرایط مناسب
- دادن کود سرک آورده به مزارع برنج و مبارزه با علفهای هرز بویژه سوروف.
- خودداری از سمپاشی و محلول پاشی در باغات و مزارع در ساعات وزش باد
- ترمیم و بازسازی پلاستیک گلخانه‌ها و کنترل دما و رطوبت و تهویه مناسب آنها
- کاشت انواع سبزیهای خوراکی و گوجه فرنگی و خیار و استفاده از روزهای شرجی حاضر برای تسریع در سبز شدن

استان زنجان :

- محافظت و تنظیم و تهویه دما، رطوبت در مرغداری‌ها، دامداری‌ها، انبارها، گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ
- احتیاط عشایر و دامداران در عبور از ارتفاعات و خودداری از استقرار کندوها در ارتفاعات و انتقال دام از واحدهای فرسوده و مستهلک در روزهای یک شنبه و دوشنبه
- برداشت به موقع گندم، جو، کلزا و گلرنگ و تحویل آن به مراکز خرید دولتی و عدم دپو محصولات برداشت شده در فضای باز در روزهای یک شنبه و دوشنبه
- ایجاد سامانه‌های موقتی از جمله سایبان در محل باغ برای کاهش حرارت مزرعه ای محصول جهت جلوگیری از ضایعات
- خودداری از باز کردن درب کندوها در ساعات بسیار گرم روز
- استقرار کلنی های زنبور عسل در سایه و در صورت نبود سایه استفاده از سایه بان

استان سیستان و بلوچستان :

- تسریع در برداشت خرما، رطب (جهت جلوگیری از ترشیدگی آن)
- خزانه گیری و کشت بذر پیاز در گلخانه برای تولید نشاء
- تسریع در برداشت عسل از کندوها
- عدم اسکان در بستر و حاشیه های رودخانه ها
- لایروبی کانال ها، مسیل ها و دهانه پل ها
- تنظیم دوره آبیاری پنبه

استان سمنان :

- برداشت محصولات رسیده و انتقال آنها به فضاهای سرپوشیده
- مبارزه با آفات پسیل و ... بدون استفاده از سموم در هنگام برداشت محصول در باغات پسته.
- خودداری از سم پاشی در مزارع و باغاتی که محصولات در مرحله رسیدن قرار دارند.
- مهار سیستم های آبیاری بارانی، عدم آبیاری سنگین باغات و کنترل استحکام سطوح پوششی سازه.

- آماده سازی اراضی جهت کشت پاییزه و آبیاری مزارع به منظور سبز شدن علفهای هرز جهت عملیات ماخار.
- خودداری از چرای دامها در ارتفاعات به خصوص در بعدازظهرها به دلیل خطرات صاعقه.

استان فارس:

- عملیات سم پاشی و محلول پاشی در ساعات خنک و آرام روز صورت گیرد.
- احتیاط در برداشت محصولات به دلیل احتمال رگبار.
- استفاده از سیستم سرمایشی (خنک کننده) در گلخانه‌ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها و تنظیم دما و رطوبت.
- اطمینان از استحکام سازه ها در مقابل وزش باد.
- تنظیم دور آبیاری در مزارع و باغات با توجه به گرمای هوا.
- در ساعات آرام روز بازدید از کندوها انجام شود واز آنها در مقابل وزش باد محافظت گردد.

استان قم:

- سمپاشی مزارع پنبه جهت مبارزه با سنک و
- مصرف کود اوره در مزارع ذرت تابستانه، مزارع چغندر علوفه ای و سورگوم علوفه ای.
- محلول پاشی ریز مغذی ها در باغات پسته، انار و گردو در ساعات خنک روز.
- استفاده از کود سولوپتاس در باغات پسته به مقدار ۳۰ کیلوگرم در هکتار جهت مغزبندی (در آب آبیاری).
- رصد آفت کرم خراط در درختان گردو.
- آغاز عملیات خاک ورزی جهت کشت پاییزه.

استان کردستان:

- کشت مزارع کلزا در مناطق سردسیر
- تهیه و تدارک نهاده های مورد نیاز کشت های پاییزه
- آبیاری منظم مزارع و باغات در ساعات خنک شبانه روز
- خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی پس از برداشت محصول
- انجام عملیات کم خاک ورزی در مزارع غلات دیم برداشت شده

استان کرمانشاه:

- اجرای عملیات هرس سلامت در باغات هسته دار.
- عملیات شخم تابستانه بعنوان مقدمات آماده سازی کشت غلات.
- مبارزه با سنک دانه خوار در مزارع آفتابگردان.
- تهیه و تامین نهاده های مورد نیاز کشت غلات نظیر بذور گواهی شده و سرویس خطی کارها.
- کیسه گیری و انتقال سریعتر سبب زمینی های برداشت شده به اماکن مسقف با دما و رطوبت مناسب.
- استفاده از ترکیبات واجد پتاسیم همراه با آبیاری جهت افزایش اندازه غده و خودداری از مصرف کود ازته در مزارع چغندر قند

استان گلستان:

- خودداری از برداشت دانه آفتابگردان با رطوبت زیاد
- آبیاری منظم در باغات، خصوصا در باغات جدیدالاحداث و یک ساله
- انجام سمپاشی و محلول پاشی در ساعات خنک روز
- انجام آبیاری منظم مزارع سویا، ذرت و مزارع خشکه کاری برنج
- کنترل آفات مکنده در مزارع سویا
- برداشت مزارع ذرت در مرحله خمیری دانه

استان گیلان:

- استفاده از پوشش پلاستیکی برای حفاظت از محصولات نگه داری شده در فضای باز کارخانجات شالیکوبی در زمان بارندگی
- باز کردن خروجی آب در مزارع شالیزاری رسیده و در حال رسیدن
- آماده سازی اراضی برداشت شده برای محصولات کشت دوم و راتون
- تنظیم و کنترل دما و رطوبت در سالن پرورش پاییزه کرم نوغان
- سرعت دادن به برداشت برگ سبز چای به جهت جلوگیری از خشبی شدن برگ
- اقدام به کشت گیاهان علوفه ای به عنوان کشت دوم در مزارع جهت تامین علوفه دام

استان لرستان:

- پایش و مبارزه با آفت تریپس در مزارع سبزی و صیفی
- جهت افزایش کیفیت محصول از بکاربردن کود ازته در مزارع چغندر قند و سیب زمینی خودداری شود
- مبارزه با سوسک ساقه خوار و پوست خوار درختان میوه
- انجام ماخار و تهیه زمین جهت کاشت زعفران در مناطق سرد استان
- پایش کنه گالزا در باغات گردو

استان مازندران:

- انجام مبارزه غیر شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی با کرم ساقه خوار برنج (با توجه به شرایط آب و هوایی و با نظر کارشناس)
- مبارزه و کنترل شیمیایی بیماری بلاست برنج (با توجه به شرایط آب و هوایی و با نظر کارشناس)
- مدیریت مزارع سویا به منظور کنترل عارضه «عدم غلاف بندی»
- تنظیم دور آبیاری باغ های مرکبات (به منظور تامین رطوبت کافی خاک و همچنین جلوگیری از تنش های محیطی)
- مبارزه شیمیایی و کانون کوبی آفت سپردار قرمز و قهوه ای در باغ های مرکبات
- آبیاری سبک و عملیات تغذیه پس از برداشت درختان میوه مناطق سردسیر و خشک (سیاه ریشه)

استان مرکزی:

- تنظیم دما و رطوبت در گلخانه ها
- برداشت و جمع آوری محصولات باقی مانده گندم و جو به انبار مناسب

استان هرمزگان:

- انجام عملیات هوادهی و ضد عفونی نشاء بادمجان قبل انتقال به زمین اصلی با احتیاط بیشتر، با توجه به ناپایداری جوی.
- انجام عملیات سمپاشی، نصب کارت رنگی، نوار رنگی و تله های فرمونی برای کنترل آفات مگس سفید، شب پره مینوز در گلخانه ها با احتیاط بیشتر با توجه به ناپایداری جوی
- تسریع در برداشت محصولات نخیلات با توجه به ناپایداری جوی.
- خودداری از چرای دام ها در مناطق مرتفع و حاشیه رودخانه ها، با توجه به ناپایداری جوی.
- تنظیم دوره آبیاری مزارع، باغات و نخیلات به صورت منظم و دوره ای و عدم آبیاری در ساعات گرم روز.
- انجام عملیات سم پاشی در گلخانه تولید نشاء و محصول بامیه با احتیاط بیشتر در ساعت های اولیه صبح، برای کنترل آفات مکنده.

استان همدان:

- تعلیف دستی دام سبک در مراتع به دلیل فقر پوشش گیاهی
- آماده سازی اراضی و برنامه ریزی سطح زیر کشت با توجه به پیش بینی وضعیت نرمال بارندگی در فصل پاییز
- خرید بذر گواهی شده، آماده سازی اراضی، کشت کلزا و انجام آبیاری بلافاصله بعد از کاشت تا پایان ماه شهریور
- آبیاری مزارع ذرت، سیب زمینی و چغندر قند در ساعات خنک روز

- بکارگیری تله های فرمونی در باغات گردو به منظور کنترل پروانه فری (کرم خراط)
- حذف پاجوش و انجام به موقع آبیاری در باغات جوان به منظور کاهش اثرات تنش کم آبی